

# 脳卒中病院前救護(PSLS)活動手順

## Step 1

### 状況評価

- ①通報者状況の確認 ②感染防御 ③携行資器材の確認
- ④現場確認・安全確認 ⑤傷病者数の確認

外傷が否定されるまで  
用手的頸椎保護

## Step 2

### 初期評価

A: 意識と気道の評価 B: 呼吸の評価 C: 循環の評価

気道・呼吸・循環が  
安定していれば  
呼吸数・脈拍数  
血圧・体温測定

### D: 神経症状の評価

詳細な意識レベル

異常肢位

CPSS(シンシナティ病院前脳卒中スケール)

ドロップテスト

瞳孔観察

内  
因  
性  
L  
&  
G  
適  
応  
か  
?

気道確保  
口腔内異物除去  
分泌物吸引  
補助呼吸  
酸素投与  
側臥位または回復体位

YES

→ 搬送開始

## Step 3

### 情報収集

問診(BAGMASK) ※糖尿病の有無

## Step 4

### 判断

- ①特定行為関連(輸液・ブドウ糖投与プロトコル)
- ②内因性L&G適応のPCEC
- ③PSLS
- ④内因性L&G適応外のPCEC

NO

PSLS以外は  
全身観察へ

発症時刻の確認  
t-PA投与対象外の確認

〈“脳卒中”か?〉

CPSS陽性またはドロップテストで左右差

突然の激しい頭痛

持続性めまいと嘔吐・頭痛

YES

## Step 5

### 重点観察

KPSS(倉敷病院前脳卒中スケール)

頭頸部の観察

〈“Hurry, but gently!”か?〉

## Step 6

### 評価・ファーストコール・特定行為

医療機関の選定 連絡と情報提供(年齢・性別・MIST)

接触より10分以内

## Step 7

### 車内活動

車内収容時の対応 継続観察 セカンドコール(必要時)